

医療用麻薬（貼付薬）
初回導入チェックシート

薬剤名

説明日

氏名

様 (ID:)

薬剤師名

項目	内容	チェック	
共通			
1	薬効 強い「痛み」を抑える薬です。持続する痛みには効果があります。	<input type="checkbox"/>	
2	用法用量 □ 1日貼付製剤： 1日 1回 枚（ 時貼替） □ 3日貼付製剤： 3日に1回 枚（ 時貼替）	<input type="checkbox"/>	
3	副作用 便秘、嘔気・嘔吐、眠気・ふらつき、排尿困難などがあります。 ①便秘 腸の動きが低下します。予防的に下剤と一緒に飲むことがあります。 ②嘔気・嘔吐 使い始めの時や量を増やした時に現れることが多いです。 身体が慣れれば1週間ほどで自然に治まります。 ③眠気 数日経つと消えていくことが多いです。 <患者様の状態に配慮し、必要な情報・分量を考慮して下さい>	<input type="checkbox"/>	
指導項目	4	包装袋の開封は、はさみを使用せず、手でやぶって取り出してください。	<input type="checkbox"/>
	5	胸・お腹・上腕部・太もものいずれか剥がれにくいところに貼ってください。	<input type="checkbox"/>
	6	使い方 体毛の少ないところに、乾いたタオルでよく拭いて、水分や汗をよく取り除いてから傷口や皮膚に異常のある場所を避けて貼ってください。	<input type="checkbox"/>
	7	貼り替える時は、前回貼った場所は避けてください。	<input type="checkbox"/>
	8	貼った後は、手のひらでしっかり押さえ、手を水道でよく洗ってください。	<input type="checkbox"/>
	9	医師の指示なく、自分の判断で使うのをやめないでください。 嘔気や嘔吐、頭痛などの症状が出ることがあります。	<input type="checkbox"/>
	10	注意事項 貼付部位に熱が加わると、必要以上に薬が体内に吸収されるおそれがあり危険です。 ・貼付部位に熱いもの(電気カーペット・カイロ・こたつ等)を近づけないでください。 ・熱いお風呂や長時間の入浴は避けてください。 ・シャワーは、なるべく貼った部位を避けて浴びてください。 ・40℃以上の熱が出た場合には、医師に相談するようにしましょう。	<input type="checkbox"/>
	11	他の人へ渡してはいけません。	<input type="checkbox"/>
12	不要となった場合は病院もしくは薬局に返却して下さい。	<input type="checkbox"/>	
13	使用中は飲酒は控えるようにして下さい。めまいや眠気が出やすくなります。	<input type="checkbox"/>	
14	自動車の運転等、危険を伴う機械の操作は行わないで下さい。	<input type="checkbox"/>	
保管	15	光・湿気を避けて室温保存し、小児やペットの手の届かない所に置いて下さい。	<input type="checkbox"/>
	16	使用が済んだら、粘着面を内側にして二つに折りたたみ、ビニール袋に入れて家庭用ゴミとして廃棄して下さい。	<input type="checkbox"/>
17	その他 誤解・不安等に対する説明（必要時） → 別紙参照	<input type="checkbox"/>	
確認項目	1	適応	<input type="checkbox"/>
	2	用法用量（速放性製剤の1回量は、徐放性製剤の1日量の1/6程度であるか）	<input type="checkbox"/>
	3	予測される副作用（便秘、嘔気など）に対する対策考慮	<input type="checkbox"/>