



薬剤部DI室(2274) No. 288

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	3
2-2 販売中止による取扱い中止	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品	5
3) 投薬日数制限解除	5
4) 使用期限変更	5
3-2 最近のお知らせ	5
4 添付文書改訂情報	5

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
サムスカ顆粒1%	トルバブタン	V ₂ -受容体拮抗剤	令和元年7月1日(月)
タリージェ錠 2.5mg/5mg/10mg	ミロガバリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤	
テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT ₁ 受容体ブロッカー	
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	抗てんかん剤	
フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤	
マグネスコープ静注38%シリンジ 15mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤	
ミノドロン酸錠50mg「三笠」	ミノドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤	
レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/ フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤	令和元年7月3日(水)
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗スクレロシンモノクローナル抗体 製剤	
ザバクサ配合点滴静注用	タゾバクタムナトリウム/ セフトロザン硫酸塩	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製 剤	
ビムパット点滴静注 200mg/20mL	ラコサミド	抗てんかん剤	
ボグリボースOD錠0.2mg 「武田テバ」	ボグリボース	食後過血糖改善剤	未定

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤	未定
オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ コムタン錠100mg	院内採用薬の適正化による中止	令和元年6月12日(水)
ベチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ベチロルファン注射液1mL供給再開による中止	令和元年6月19日(水)
ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14% シリンジ10mL「F」	マグネスコープ静注38%シリンジ15mLの採用に伴う中止	令和元年6月30日(日)
※ リカルボン錠50mg	ミノドロン酸錠50mg「三笠」の採用に伴う中止	
※ レルベア100エリプタ14吸入用	レルベア200エリプタ14吸入用の採用に伴う中止	
※ エトドラク錠200mg	タリージェ錠2.5mgの採用に伴う中止	
フェノバル注射液100mg/1mL	ビムパット点滴静注200mg/20mLの採用に伴う中止	
※ ベネット錠17.5mg	イベニティ皮下注105mgシリンジの採用に伴う中止	未定
ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」の採用に伴う中止	
※ モービック錠10mg	タリージェ錠10mgの採用に伴う中止	

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ タミフルカプセル75	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」の採用に伴う中止	未定
※ タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルDS3%「サワイ」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ヘプタバックスーⅡ 10μg/0.5mL	販売中止のため	令和元年5月31日(金)

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アーリーダ錠60mg	1T:60mg	アパルタミド [*]	前立腺癌治療剤
イノラス配合経腸用液 (りんごフレーバー)／ (ヨーグルトフレーバー) 187.5mL	1袋:187.5mL(300kcal)		経腸栄養剤(経口・経管両用)
エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 1500mL／2000mL	1袋:1500mL／2000mL		腹膜透析用剤
シンポニー皮下注50mg オートインジェクター	1本(0.5mL):50mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
デシコピ配合錠HT	1T:エトリシタピン200mg／ テノホビル アラフェナミド [*] として 25mg	エトリシタピン／ テノホビル アラフェナミド [*] フマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
テリルジー100エリプタ 14吸入用／30吸入用	1個:フルチカゾンフランカルボン酸 エステル 100 μ g／ウメクリジニウム として62.5 μ g／ビランテロール として25 μ g	フルチカゾンフランカルボン酸エス テル／ウメクリジニウム臭化物 ／ビランテロールトリフェニル酢酸 塩	3成分配合COPD治療剤
ブリリンタ錠60mg	1T:60mg	チカグレロル	抗血小板剤
ラグノスNF経口ゼリー分包12g／ 包	1包(12g):6.5g	ラクツロース	生理的腸管機能改善剤／ 高アンモニア血症用剤
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 UVツインバッグ1500mL／ シングルバッグ・機器専用2500mL／ ツインバッグ2000mL／ シングルバッグ・機器専用5000mL	1袋: 1500mL／2000mL／ 2500mL／5000mL		腹膜透析用剤
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 UVツインバッグ1500mL／ シングルバッグ・機器専用2500mL／ ツインバッグ2000mL／ シングルバッグ・機器専用5000mL	1袋: 1500mL／2000mL／ 2500mL／5000mL		腹膜透析用剤
レギュニール LCa 4. 25腹膜透析 液シングルバッグ・機器専用2000mL	1袋:2000mL		腹膜透析用剤
ロソーゼット配合錠LD	1T:エセチミド [*] 10mg／ ロスバスタチンとして2.5mg	エセチミド [*] ／ ロスバスタチンカルシウム	小腸コレステロールトランスポー ター阻害剤／HMG-CoA還元酵 素阻害剤配合剤
ロソーゼット配合錠HD	1T:エセチミド [*] 10mg／ ロスバスタチンとして5mg	エセチミド [*] ／ ロスバスタチンカルシウム	小腸コレステロールトランスポー ター阻害剤／HMG-CoA還元酵 素阻害剤配合剤
UV APDキット			腹膜灌流用回路及び関連用具セット
ホームAPDシステムゆめセット (つなぐ4バッグ用少注液量セット)			自動腹膜灌流装置用回路及び関 連用具セット
ホームAPDシステムゆめセット (つなぐ5バッグ用セット)			自動腹膜灌流装置用回路及び関 連用具セット
ホームPDシステムかぐやセット			自動腹膜灌流装置用回路及び関 連用具セット
ホームPDシステムつなぐセット (排液バッグ)			腹膜灌流用回路及び関連用具セット
ホームPDシステムつなぐセット (キャップキット)			腹膜灌流用回路及び関連用具セット

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ヘプタバックスーII 10 μ g / 0.5 mL」 取扱い中止について 令和元年5月31日
- ・ 「メナテトレノンカプセル15mg 「トーワ」」の自主回収について 令和元年6月4日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 363 令和元年6月5日
- ・ 検査用薬の入力方法変更について 令和元年6月11日
- ・ 「ケーサプライ錠600mg」の処方見直しについて 令和元年6月12日
- ・ 「コムタン錠100mg」取扱い中止について 令和元年6月12日
- ・ 「メトグルコ」使用上の注意（禁忌・併用禁忌事項）改訂のお知らせ 令和元年6月19日
- ・ 「ペチジン塩酸塩注射液50mg 「タケダ」 1mL」取扱い中止について 令和元年6月19日
- ・ 「アダラートL錠20mg（院外専用）」の安定供給の再開について 令和元年6月20日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
サイラムザ点滴静注液100mg/500mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アマージ錠(グラクソ・スミスクライン)	ナラトリプタン塩酸塩	注意・副
イミグラン錠(グラクソ・スミスクライン)	スマトリプタンコハク酸塩	注意・副
イミグラン点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	スマトリプタン	注意・副
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=プリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	慎重・副
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	慎重・副
ゾーミッグRM錠(沢井製薬)	ゾルミトリプタン	注意・副
ゾーミッグ錠(沢井製薬)	ゾルミトリプタン	注意・副
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	副
ベージニオ錠(日本イーライリリー)	アベマシクリブ	警告・慎重・注意・副
マクサルトRPD錠(杏林製薬=エーザイ)	リザトリプタン安息香酸塩	注意・副
レルパックス錠(ファイザー)	エレトリプタン臭化水素酸塩	注意・副
アクテムラ点滴静注用(中外製薬)	トシリズマブ(遺伝子組換え)(点滴静注用)	その他
インチュニブ錠(塩野義製薬=武田薬品)	グアンファシン塩酸塩	その他
オースギ半夏厚朴湯エキスT錠(大杉製薬)	半夏厚朴湯	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=プリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
オラネジン液消毒用アプリケーション(大塚製薬工場)	オラネキシジングルコン酸塩	その他
カンデサルタン錠「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	カンデサルタンシレキセチル (小児の高血圧症の効能を有する製剤)	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (クラシエ製薬=クラシエ薬品)	半夏厚朴湯	その他
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 (大峰堂薬品工業=クラシエ薬品)	半夏厚朴湯	その他
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)	その他
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	その他
タイケルブ錠(ノバルティスファーマ)	ラパチニプトシル酸塩水和物	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	タクロリムス水和物(経口剤)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」(あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)	その他
チャンピックス錠(ファイザー)	バレニクリン酒石酸塩	その他
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	半夏厚朴湯	その他
ドネペジル塩酸塩OD錠「DSP」(大日本住友製薬)	ドネペジル塩酸塩(左記ジェネリック製品)	その他
ネイリンカプセル(佐藤製薬=エーザイ)	ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物	その他
バキソカプセル(富士フイルム富山化学)	ピロキシカム(経口剤)	その他
ビクトーザ皮下注(ノボルディスクファーマ)	リラグルチド(遺伝子組換え)	その他
プラリア皮下注シリンジ(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(60mg)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重・慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
フリウェル配合錠LD・ULD「モチダ」 (持田製薬販売＝持田製薬)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール (月経困難症の効能を有する製剤)	その他
フルカムカプセル(ファイザー)	アンピロキシカム	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)	その他
プログラフ注射液(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(注射剤)	その他
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)	その他
プロプレス錠(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル (小児の高血圧症の効能を有する製剤)	その他
ベージニオ錠(日本イーライリリー)	アバマシクリブ	その他
マイトマイシン注用(協和発酵キリン)	マイトマイシンC	その他
ヤーズフレックス配合錠(バイエル薬品)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(子宮内 膜症に伴う疼痛の改善の効能を有する製剤)	その他
ランマーク皮下注(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(120mg)	その他
ルナベル配合錠LD・ULD (ノーバルファーマ＝日本新薬＝富士製薬工業)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(ルナベル)	その他
ワコビタル坐剤(高田製薬)	フェノバルビタルナトリウム(坐剤)	その他
静注用フローラン(グラクソ・スミスクライン)	エポプロステノールナトリウム(フローラン)	その他
静注用フローラン(グラクソ・スミスクライン)	エポプロステノールナトリウム(小児の用法・用量を有しない製剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示