

がん種	番号	レジメン名称	リンク
悪性胸膜中皮腫	17001	CDDP+PEM(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17002	PEM(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17003	CBDCA+PEM(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17005	DTX(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17007	GEM(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17008	オブジーボ(240mg固定_1コース2週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17009	VNR(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17010	オブジーボ(480mg固定_1コース4週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17011	NIV+IPI 奇数C(1コース3週)	シート
悪性胸膜中皮腫	17012	NIV+IPI 偶数C(1コース3週)	シート

レジメン名	CDDP+PEM (11-13週)		レジメン No.	17001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
悪性胸膜中皮腫	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	75mg/m ²	day1		
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2,3		
葉酸	0.5mg/日	アリムタ開始1週間前から連日 (全コース終了後22日目まで)		
特記事項				

Day 1 -3はOS-1 1Lの飲水もしくは同等の水分と塩分 (3g) を推奨。

Day2,3は飲水などにより尿量1000mL以上確保する。

レジメン名	PEM (1コース3週)	レジメン No.	17002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性胸膜中皮腫	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	アリムタ開始7日前から連日(全コース終了後22日目まで)	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			

レジメン名	CBDCA+PEM (1ｺｰｽ3週)		レジメン No.	17003
対象癌種	1ｺｰｽ日数	催吐リスク		
悪性胸膜中皮腫	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2,3		
葉酸	0.5m g/日	アリムタ開始1週間前から連日投与 (全ｺｰｽ終了後22日目まで)		
特記事項				

レジメン名	【転】 DTX (1コース3週)	レジメン No.	17005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性胸膜中皮腫	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ドセタキセル	60mg/m2	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	【転】 GEM (11-13週)	レジメン No.	17007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性胸膜中皮腫	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1,8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ（240mg固定_ 1コース2週）	レジメン No.	17008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性胸膜中皮腫	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240m g/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	VNR(11-13週)	レジメン No.	17009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ビンレルビン	25mg/m ²	day1,8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ（480mg固定_ 1コース4週）	レジメン No.	17010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性胸膜中皮腫	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	NIV+IPI 奇数C(17-23週)		レジメン No.	17011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg/body	day1		
イピリムマブ	1mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	NIV+IPI 偶数C(17-23週)		レジメン No.	17012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				