

がん種	番号	レジメン名称	リンク
肝臓癌	55002	【診】外来 天野 肝動注(1コース1週)	シート
肝臓癌	55004	サイラムザ療法(1コース2週)	シート
肝臓癌	55005	Bev+テセントリク(1コース3週)	シート
肝臓癌	55006	肝動注 Weekly High Dose 5-FU	シート
肝臓癌	55008	外来 肝動注 5-FU+CDDP(1コース1週)	シート
肝臓癌	55009	5-FU動注+GEM全身(1コース4週)	シート
肝臓癌	55010	5-FU動注+GEM全身(1コース3週)	シート
肝臓癌	55011	肝動注 5-FU動注+CPT-11全身投与	シート
肝臓癌	55012	イミフィンジ(1コース4週)	シート
肝臓癌	55013	イジユド+イミフィンジ(1コース4週)	シート
手術不能例 胆道癌	14001	GEM(1コース4週)	シート
手術不能 胆道癌	14002	GEM+S-1併用療法(1コース4週)	シート
胆道癌	14003	GC(1コース3週)	シート
胆道癌	14004	GC(1コース2週)	シート
手術不能例 胆道癌	14005	GEM(1コース3週)	シート
胆道癌	14007	GCS療法(1コース2週)	シート
胆のう癌神経内分泌腫瘍	14008	CDDP+CPT-11(1コース4週)	シート
胆のう神経内分泌腫瘍	14009	CDDP+VP-16(1コース3週)	シート
胆道癌	14011	Biweekly GEM 療法(1コース4週)	シート
胆道癌	14012	GEM+S-1併用療法(1コース3週)	シート
胆道癌	14013	GC+イミフィンジ(1コース3週)	シート
胆道癌	14014	イミフィンジ維持療法(1コース4週)	シート

レジメン名	【診】 外来 天野 肝動注	レジメン No.	55002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
肝臓癌	7日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	10mg/body	day1	
フルオロウラシル	750mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	サイラムザ療法	レジメン No.	55004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
肝癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ラムシルマブ	8mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Bev+テセントリク		レジメン No.	55005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
肝細胞癌	21日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	肝動注 Weekly High Dose 5-FU	レジメン No.	55006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌肝転移	7日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	day 1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	外来 肝動注 5-FU+CDDP	レジメン No.	55008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性肝癌	7日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	10mg/body	day1	
フルオロウラシル	750mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	5-FU動注+GEM全身（1コース4週）	レジメン No.	55009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
膵癌・胆道癌肝転移	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	day1,8,15	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	5-FU動注+GEM全身（1コース3週）	レジメン No.	55010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
膵癌・胆道癌肝転移	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	day1,8	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	肝動注 5-FU動注+CPT-11全身投与	レジメン No.	55011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌肝転移	28日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	day1,8,15	
イリノテカン	150mg/m ²	day1,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

	イミフィンジ	レジメン No.	55012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
肝癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

	イジユド+イミフィンジ	レジメン No.	55013
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
肝癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
トレメリムマブ	300mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	GEM(1コース4週)		レジメン No.	14001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
手術不能例 胆道癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	GEM+S-1併用療法（1コース4週）		レジメン No.	14002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
手術不能 胆道癌	28日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1,15		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記に準ず	day 1~14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

1.25m²未満：40mg/回×2/日

1.25~1.5m²未満：50mg/回×2/日

1.5m²以上：60mg/回×2/日

レジメン名	GC (1コース3週)		レジメン No.	14003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胆道癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	25mg/m ²	day 1,8		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1,8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	GC (1コース2週)	レジメン No.	14004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胆道癌	14日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	25mg/m ²	day 1	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	GEM(1コース3週)		レジメン No.	14005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
手術不能例 胆道癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	GCS療法（1コース2週）		レジメン No.	14007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胆道癌	14日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1		
シスプラチン	25mg/m ²	day1		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記に準ず	day 1~7		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

S-1投与量→減量した場合

1.25m²未満：80mg/日→60mg/日

1.25~1.5m²未満：100mg/日→80mg/日

1.5m²以上：120mg/日→100mg/日

レジメン名	CDDP+CPT-11（1コース4週）		レジメン No.	14008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胆のう癌神経内分泌腫瘍	28日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	60mg/m ²	day1		
イリノテカン	60mg/m ²	day1,8,15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/day	day2,3		
特記事項				

CPT-11のday15をSkipした場合は3週毎
Day1は2L、Day2,3は1L飲水を行うこと。
Day2、3は飲水などにより尿量1000mL以上確保する。

レジメン名	CDDP+VP-16(17-23週)		レジメン No.	14009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胆のう神経内分泌腫瘍	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m ²	day1		
エトポシド	100mg/m ²	day1,2,3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/day	day2,3		
特記事項				

Day 1 は2L,Day2,3は 1 L 飲水を行うこと。

Day2,3は飲水などにより尿量1000mL以上確保する。

レジメン名	Biweekly GEM 療法 (1コース4週)	レジメン No.	14011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胆道癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	GEM+S-1併用療法(1コース3週)		レジメン No.	14012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胆道癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記に準ず	day 1~14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム

- 1. 25m²未満 : 60mg/日
- 1. 25~1.5m²未満 : 80mg/日
- 1. 1.5m²以上 : 100mg/日

レジメン名	GC+イミフィンジ（1コース3週）	レジメン No.	14013
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胆道癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	25mg/m ²	day 1,8	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1,8	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

	イミフィンジ維持療法	レジメン No.	14014
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胆道癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			