

がん種	番号	レジメン名称	リンク
大腸癌	08001	FOLFIRI	シート
大腸癌	08002	m-FOLFOX6	シート
大腸癌	08007	sLV5FU2	シート
大腸癌	08012	アバステチン+FOLFIRI	シート
大腸癌	08013	5 mg/kg Beva+m-FOLFOX6	シート
大腸癌	08016	AVASTIN+sLV5FU2	シート
大腸癌	08019	アービタックス+カンプト毎週投与方法	シート
大腸癌	08020	アービタックス+カンプト隔週投与方法	シート
大腸癌	08021	アービタックス単剤投与方法	シート
大腸癌	08023	FOLFILI+アービタックス	シート
大腸癌	08024	m-FOLFOX6+Cetu	シート
大腸癌	08027	XELOX+Bevacizumab	シート
大腸癌	08028	XELOX	シート
大腸癌	08029	ゼローダ+Bevacizumab	シート
大腸癌	08032	ベクティビックス単剤	シート
切除不能大腸癌	08038	IRIS	シート
大腸癌	08040	m-FOLFOX6+Panitumumab	シート
大腸癌	08041	SOX+Bevacizumab	シート
大腸癌	08042	Pmab+FOLFIRI	シート
大腸癌	08043	bi-weekly CPT-11	シート
大腸癌	08044	bi-weekly CPT-11+Bevacizumab	シート
大腸癌	08045	bi-weekly CPT-11+Panitumumab	シート
大腸癌	08047	Bev+ロンサーフ	シート
大腸癌	08048 08049	XELOX+Cetuximab	シート
切除不能大腸癌	08050	IRIS+BV	シート
大腸癌	08051	サイラムザ+FOLFIRI	シート
大腸癌	08052	UFT/LV+Bevacizumab	シート
大腸癌	08057	m-FOLFOXIRI+Bev	シート
大腸癌	08058	SOX	シート
大腸癌	08059	Aflibercept+FOLFIRI	シート
大腸癌	08060	XELIRI+Bev	シート
大腸癌	08061	Biweeklyアービタックス+FOLFIRI	シート
大腸癌	08062 08063	ERBITUX+CPT-11biweekly	シート
MSI-high 大腸癌	08064	オブジーボ(240mg固定)	シート
MSI-high 大腸癌	08065	オブジーボ(480mg固定)	シート
MSI-high 大腸癌	08066	ヤーボイ+オブジーボ	シート
BRAF陽性大腸癌	08068	BEACON CRC C-mab	シート
小腸癌(十二指腸癌)	08069	S-1+L-OHP(SOX)	シート
大腸癌	08070	初回 HER+PER 療法	シート
大腸癌	08071	2回目以降HER+PER 療法	シート
大腸癌	08072	Biweeklyアービタックス+mFOLFOX6	シート
小腸癌	09002	m-FOLFOX6	シート

レジメン名	Biweeklyアービタックス+mFOLFOX6	レジメン No.	08072
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	初回用HER+PER	レジメン No.	8070
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペルツズマブ	840 mg/body	day1	
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	2回目以降HER+PER		レジメン No.	8071
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ペルツズマブ	420 mg/body	day1		
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	FOLFIRI		レジメン No.	08001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	m-FOLFOX6	レジメン No.	08002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	sLV5FU2	レジメン No.	08007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	アバスチン+FOLFIRI		レジメン No.	08012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	5 mg/kg Beva + m-FOLFOX6	レジメン No.	08013
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	AVASTIN + sLV5FU2		レジメン No.	08016
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ペバシズマブ	5 mg/kg	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	アービタックス+カンプト毎週投与法	レジメン No.	08019
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	42日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	
イリノテカン	100 mg/m ²	day1,8,15,22	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	アービタックス+カンプト隔週投与法	レジメン No.	08020
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	49日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1,8,15,22,29,36,43	
イリノテカン	150 mg/m ²	day1,15,29	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	アービタックス単剤投与法	レジメン No.	08021
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	7日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	FOLFILI+アービタックス		レジメン No.	08023
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1,8		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	m-FOLFOX6+Cetu		レジメン No.	08024
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1,8		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	XELOX + Bevacizumab		レジメン No.	08027
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
カペシタビン	1000 mg/m ² x 2回/日	day1-14		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
XELOXにおけるゼロータ体表面積あたりの通常投与量				
体表面積	1回用量	日量		
1.36 m ² 未満	1200mg	4T × 2		
1.36 m ² 以上1.66 m ² 未満	1500mg	5T × 2		
1.66 m ² 以上1.96 m ² 未満	1800mg	6T × 2		
1.96 m ² 以上	2100mg	7T × 2		

レジメン名	XELOX		レジメン No.	08028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
カペシタビン	1000 mg/m ² x 2回/日	day1-14		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
XELOXにおけるゼロータ体表面積あたりの通常投与量				
体表面積	1回用量	日量		
1.36 m ² 未満	1200mg	4T × 2		
1.36 m ² 以上1.66 m ² 未満	1500mg	5T × 2		
1.66 m ² 以上1.96 m ² 未満	1800mg	6T × 2		
1.96 m ² 以上	2100mg	7T × 2		

レジメン名	ゼローダ + Bevacizumab		レジメン No.	08029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
カペシタビン	1000 mg/m ² x 2回/日	day1-14		
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
ゼローダ体表面積あたりの通常投与量				
体表面積	1回用量	日量		
1.36m ² 未満	1200mg	4T x 2		
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1500mg	5T x 2		
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1800mg	6T x 2		
1.96m ² 以上	2100mg	7T x 2		

レジメン名	ベクティビックス単剤	レジメン No.	08032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
パニツムマブ	6 mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	IRIS		レジメン No.	08038
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
切除不能大腸癌	28日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
イリノテカン	125 mg/m ²	day1,15		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ²	day1-14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
体表面積		初回基準量(テガフル相当量)		
1. 25m ² 未満		40mg/回		
1. 25m ² 以上~1. 5m ² 未満		50mg/回		
1. 5m ² 以上		60mg/回		

レジメン名	m-FOLFOX6 + Panitumumab		レジメン No.	08040
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
パニツムマブ	6 mg/kg	day1		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	SOX + Bevacizumab		レジメン No.	08041
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ²	day1-14		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
体表面積	初回基準量(テガフル相当量)			
1. 25m ² 未満	40mg/回			
1. 25m ² 以上～1. 5m ² 未満	50mg/回			
1. 5m ² 以上	60mg/回			

レジメン名	Pmab+FOLFIRI		レジメン No.	08042
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
パニツムマブ	6 mg/kg	day1		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	bi-weekly CPT-11		レジメン No.	08043
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	bi-weekly CPT-11 + Bevacizumab	レジメン No.	08044
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	bi-weekly CPT-11 + Panitumumab	レジメン No.	08045
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
パニツムマブ	6 mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Bev+ロンサーフ		レジメン No.	08047
対象癌種	1コース日数		催吐リスク	
大腸癌	28日		中等度	
一般名	標準投与量		投与日	
トリフルリジン チピラシル塩酸塩	35 mg/m ² x 2回/日		day1-5 day8-12	
ベバシズマブ	5 mg/kg		day1,15	
内服支持療法				
一般名	標準投与量		投与日	
特記事項				
体表面積(m2)	初回基準量 (トリフルリジン相当量)	体表面積(m2)	初回基準量 (トリフルリジン相当量)	
1. 07未満	35mg/回(70mg/日)	1. 69以上~1. 84未満	60mg/回(120mg/日)	
1. 07以上~1. 23未満	40mg/回(80mg/日)	1. 84以上~1. 99未満	65mg/回(130mg/日)	
1. 23以上~1. 38未満	45mg/回(90mg/日)	1. 99以上~2. 15未満	70mg/回(140mg/日)	
1. 38以上~1. 53未満	50mg/回(100mg/日)	2. 15以上	75mg/回(150mg/日)	
1. 53以上~1. 69未満	55mg/回(110mg/日)			

レジメン名	XELOX + Cetuximab		レジメン No.	08048 08049
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
カペシタビン	1000 mg/m ² x 2回/日	day1-14		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1		
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1,8,15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
XELOXにおけるゼロータ体表面積あたりの通常投与量				
体表面積	1回用量	日量		
1.36 m ² 未満	1200mg	4T × 2		
1.36 m ² 以上1.66 m ² 未満	1500mg	5T × 2		
1.66 m ² 以上1.96 m ² 未満	1800mg	6T × 2		
1.96 m ² 以上	2100mg	7T × 2		

レジメン名	IRIS+BV		レジメン No.	08050
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
切除不能大腸癌	28日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
イリノテカン	100 mg/m ²	day1,15		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ²	day1-14		
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1,15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
体表面積		初回基準量(テガフル相当量)		
1. 25m ² 未満		40mg/回		
1. 25m ² 以上~1. 5m ² 未満		50mg/回		
1. 5m ² 以上		60mg/回		

レジメン名	サイラムザ+FOLFIRI		レジメン No.	08051
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ラムシルマブ	8 mg/kg	day1		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	UFT/LV + Bevacizumab				レジメン No.	08052
対象癌種	1コース日数		催吐リスク			
大腸癌	21日		軽度			
一般名	標準投与量		投与日			
ベバシズマブ	7.5 mg/kg		day1			
テガフル ウラシル	100 mg/m ² ×3回/日		day1-5,8-12,15-19			
ホリナートカルシウム	25 mgX3回/日		day1-5,8-12,15-19			
内服支持療法						
一般名	標準投与量		投与日			
特記事項						
UFT/ユーゼルまたはロイコボリン錠の減量方法						
体表面積	初回基準投与量	1日投与量	1段階減量1日投与量	2段階減量1日投与量		
	UFT	ユーゼル or ロイコボリン	UFT	ユーゼル or ロイコボリン	UFT	ユーゼル or ロイコボリン
<1.17	300	75	200	50	—	—
1.17-1.49	400	75	300	75	200	50
1.5-1.83	500	75	400	75	300	75
>1.83	600	75	500	75	400	75

レジメン名	m-FOLFOXIRI + Bev		レジメン No.	08057
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	SOX		レジメン No.	08058
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ²	day1夕 - 15朝		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
体表面積	初回基準量(テガフル相当量)			
1. 25m ² 未満	40mg/回			
1. 25m ² 以上~1. 5m ² 未満	50mg/回			
1. 5m ² 以上	60mg/回			

レジメン名	Aflibercept + FOLFIRI		レジメン No.	08059
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
アフリベルセプト ベータ	4 mg/kg	day1		
イリノテカン	150 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	XELIRI+Bev		レジメン No.	08060																																															
対象癌種	1コース日数		催吐リスク																																																
切除不能大腸癌	21日		中等度																																																
一般名	標準投与量		投与日																																																
イリノテカン	200 mg/m ²		day1																																																
カペシタビン	800 mg/m ² x 2回/日		day1-14																																																
ベバシズマブ	7.5 mg/kg		day1																																																
内服支持療法																																																			
一般名	標準投与量		投与日																																																
特記事項																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ゼロータ投与量</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">体表面積</th> <th rowspan="2">開始用量</th> <th colspan="3">1回投与量</th> </tr> <tr> <th>1段階減量</th> <th colspan="2">2段階減量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.26未満</td> <td rowspan="2">900mg</td> <td>600mg</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>1.26以上1.31未満</td> <td>→</td> <td colspan="2" rowspan="2">600mg</td> </tr> <tr> <td>1.31以上1.69未満</td> <td>1200mg</td> <td>900mg</td> <td colspan="2" rowspan="2">900mg</td> </tr> <tr> <td>1.69以上1.76未満</td> <td rowspan="2">1500mg</td> <td>1200mg</td> <td colspan="2" rowspan="2">900mg</td> </tr> <tr> <td>1.76以上1.88未満</td> <td>1800mg</td> <td>1500mg</td> </tr> <tr> <td>1.88以上2.07未満</td> <td rowspan="2">1800mg</td> <td>1500mg</td> <td colspan="2" rowspan="2">900mg</td> </tr> <tr> <td>2.07以上2.26未満</td> <td>1500mg</td> </tr> <tr> <td>2.26以上</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					ゼロータ投与量					体表面積	開始用量	1回投与量			1段階減量	2段階減量		1.26未満	900mg	600mg	-		1.26以上1.31未満	→	600mg		1.31以上1.69未満	1200mg	900mg	900mg		1.69以上1.76未満	1500mg	1200mg	900mg		1.76以上1.88未満	1800mg	1500mg	1.88以上2.07未満	1800mg	1500mg	900mg		2.07以上2.26未満	1500mg	2.26以上				
ゼロータ投与量																																																			
体表面積	開始用量	1回投与量																																																	
		1段階減量	2段階減量																																																
1.26未満	900mg	600mg	-																																																
1.26以上1.31未満		→	600mg																																																
1.31以上1.69未満	1200mg	900mg			900mg																																														
1.69以上1.76未満	1500mg	1200mg	900mg																																																
1.76以上1.88未満		1800mg			1500mg																																														
1.88以上2.07未満	1800mg	1500mg	900mg																																																
2.07以上2.26未満		1500mg																																																	
2.26以上																																																			

レジメン名	ERBITUX+CPT-11biweekly		レジメン No.	08062 08063
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
大腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1,8		
イリノテカン	初回100 mg/m ² 2回目以降150 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	m-FOLFOX6		レジメン No.	09002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小腸癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	S-1+L-OHP (SOX)		レジメン No.	08069
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小腸癌 (十二指腸癌)	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120mg/body/day	day1夕 - 15朝		
オキサリプラチン	100 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
体表面積		初回基準量 (テガフル相当量)		
1. 25m ² 未満		40mg/回		
1. 25m ² 以上 ~ 1. 5m ² 未満		50mg/回		
1. 5m ² 以上		60mg/回		

レジメン名	Biweeklyアービタックス+FOLFIRI	レジメン No.	08061
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
大腸癌	14日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	
イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オブジーボ(240mg固定)	レジメン No.	08064
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
MSI-high 大腸癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
MSI-High大腸癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。			

レジメン名	オブジーボ(480mg固定)	レジメン No.	08065
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
MSI-high 大腸癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
MSI-High大腸癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。			

レジメン名	ヤーボイ+オプジーボ	レジメン No.	08066
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
MSI-high 大腸癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
イピリムマブ	1mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
MSI-High大腸癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。			

レジメン名	BEACON CRC Cmap		レジメン No.	08068
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
BRAF陽性大腸癌	7日	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	初回400 mg/m ² 2回以降250 mg/m ²	day1		
エンコラフェニブ	300 mg/body×1回/日	day1-7		
ビニメチニブ*	45 mg/body x 2回/日	day1-7		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
*ビニメチニブ併用の場合				