

がん種	番号	レジメン名称	リンク
原発不明癌 (小細胞癌・NEC)	16008	CDDP+ETP(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
悪性神経膠腫	32005	10mg/kg Bevacizumab(1コース2週)	<a href="#">シート</a>
悪性神経膠腫	32006	15mg/kg Bevacizumab(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
悪性神経膠腫	32009	テモゾロミド+Bevacizumab(1コース4週)	<a href="#">シート</a>
悪性神経膠腫	32013	テモゾロミド(内服)+Bevacizumab(1コース4週)	<a href="#">シート</a>
全身性強皮症	54014	リツキササン(1コース1週)	<a href="#">シート</a>
MSI-High固形癌	60001	キイトルーダ(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
MSI-High固形癌	60002	キイトルーダ(1コース6週)	<a href="#">シート</a>
TMB-High固形癌	60003	キイトルーダ(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
TMB-High固形癌	60004	キイトルーダ(1コース6週)	<a href="#">シート</a>
異所性小細胞癌	61001	CBDCA+VP-16(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
小細胞癌・NEC	61003	CDDP+ETP(1コース3週)	<a href="#">シート</a>

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No.	60003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
TMB-High固形癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメン No.	60004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
TMB-High固形癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	10mg/kg Bevacizumab	レジメン No.	32005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性神経膠腫	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベバシズマブ	10mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	15mg/kg Bevacizumab	レジメン No.	32006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性神経膠腫	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	テモゾロミド + Bevacizumab		レジメン No.	32009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
悪性神経膠腫	28日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
テモゾロミド	1コース目 : 150mg/m <sup>2</sup> 2コース目以降 : 200mg/m <sup>2</sup> へ増量可	day1-5		
ベバシズマブ	10mg/kg	day1, 15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	テモゾロミド（内服） + Bevacizumab	レジメン No.	32013
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
悪性神経膠腫	28日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
テモゾロミド	1コース目：150mg/m <sup>2</sup> 2コース目以降：200mg/m <sup>2</sup> へ増量可	day1-5（空腹時）	
ベバシズマブ	10mg/kg	day1, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No.	60001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
MSI-High固形癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
MSI-High固形癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。			



レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメン No.	60002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
MSI-High固形癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
MSI-High固形癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。			

レジメン名	CBDCA+VP-16		レジメン No.	61001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
異所性小細胞癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CDDP+ETP(11-13週)		レジメン No.	16008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
原発不明癌 (小細胞癌・NEC)	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2,3		
特記事項				
Day 1 -3はOS-1 1Lの飲水もしくは同等の水分と塩分 (3g) を推奨。				

レジメン名	CDDP+ETP		レジメン No.	61003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞癌・NEC	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	リツキサン/全身性強皮症	レジメン No.	54014
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
全身性強皮症	7日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			